

レジメン番号	0168	レジメン名	Cetuximab + FOLFIRI
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	アービタックス、レボホリナート、フルオロウラシル、トポテシン
がん腫	大腸癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day8 ( / )	…Day15	Day1 ( / )
レボホリナート(1-LV) 200mg/ m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		2週間を1クール	↓
フルオロウラシル (5FU) 400mg/ m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓			↓
トポテシン(CPT-11) 150mg/ m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓			↓
フルオロウラシル (5FU) 2400mg/ m <sup>2</sup>	持続 注入	mg	↓			↓
アービタックス(Cetuximab) 初回 400mg/ m <sup>2</sup> 以後 250mg/ m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	○ mg	↑		2週間を1クール	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	mg	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①レボホリナート	25mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
	100mg		
② フルオロウラシル	250mg	生食 50mL	全開/点滴
	1000mg		
②' フルオロウラシル	250mg	生食適量	46hr 持続注入
	1000mg		
③トポテシン	40mg	5%ブドウ糖液 250mL	90分/点滴
	100mg		
④アービタックス	100mg	生食 250mL	下記参照/点滴
⑤	アロキシ	生食 100mL	15分/点滴
	グラニセトロン		
	デキサート		
	ネオレスタール		
⑥ 生食	100ml	生食 100ml	30分/点滴
⑦	デキサート	生食 100ml	15分/点滴
	ネオレスタール		
⑧ 生食	100ml	生食 100ml	60分/点滴

(Day1)

投与間隔≫ (15分) (30分) (下記参照) (60分) ③ (90分) ①終了後 (全開) 46時間 (持続注入)

投与順番≫ ⑤ → ⑥ → ④ → ⑧ → ① (120分) → ② → ②' → 終了

(Day8)

投与間隔≫ (15分) (30分) (下記参照) (60分)

投与順番≫ ⑦ → ⑥ → ④ → ⑧ → 終了

【備考】

④アービタックス投与速度：初回 120分/2回目以降 60分