

レジメン番号	0198	レジメン名	Panitumumab + FOLFIRI
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	ベクティビックス、レボホリナート、フルオロウラシル、トポテシン
がん腫	大腸癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day14	Day1 (/)
レボホリナート(1-LV) 200mg/ m ²	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
フルオロウラシル (5FU) 400mg/ m ²	点滴	mg	↓		↓
トポテシン(CPT-11) 150mg/ m ²	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル (5FU) 2400mg/ m ²	持続注入	mg	↓		↓
ベクティビックス (Panitumumab) 6mg/kg	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑	2週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①レボホリナート	25mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
	100mg		
②フルオロウラシル	250mg	生食 50mL	全開/点滴
	1000mg		
②'フルオロウラシル	250mg	生食適量	46hr 持続注入
	1000mg		
③トポテシン	40mg	5%ブドウ糖液 250mL	90分/点滴
	100mg		
④ベクティビックス	100mg	生食 100mL	60分/点滴
⑤ アロキシ グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100mL	30分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
⑥生食	250ml	生食 250ml	下記参照/点滴



【備考】

ベクティビックス投与終了からトポテシン投与開始までの時間 (生食⑥の投与時間)

初回 60分/2回目以降 15分