

レジメン番号	0322	レジメン名	Bev+XELIRI
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	アバスチン、ゼローダ、トポテシン
がん腫	大腸癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	...	Day14 ( / )	...Day21	Day1 ( / )
トポテシン(CPT-11) 200mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓			3週間を1コース	↓
アバスチン(Bev) 7.5mg/kg	点滴	mg	↓				↓
ゼローダ 1600mg/m <sup>2</sup> /日	内服	mg	↓	↓↓	↓		↓

(支持療法)

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑		3週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①トポテシン	40mg	5%ブドウ糖液 250mL	90分/点滴
	100mg		
②アバスチン	100mg	生食 100 mL	※下記参照
	400mg		
③ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	5%ブドウ糖液 100mL	15分/点滴
	3mg		
	3.3mg		

投与間隔≫ (※下記参照) (15分) (90分)  
 投与順番≫ ② → ③ → ① → 終了

【備考】

※ アバスチン：初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分