

レジメン番号	0330	レジメン名	Bev+FOLFOXIRI
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	アバスチン、フルオロウラシル、レボホリナート、エルプラット、トポテシン
がん腫	大腸癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day14	Day1 (/)
トポテシン(CPT-11) 165mg/m ²	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
レボホリナート(1-LV) 200mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
エルプラット(1-OHP) 85mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル (5FU) 3200mg/m ²	持続 注入	mg	↓		↓
アバスチン(Bev) 5mg/kg	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	○ mg	↑	2週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①トポテシン	40mg	5%ブドウ糖液 500mL	60分/点滴
	100mg		
②レボホリナート	25mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
	100mg		
③エルプラット	100mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
④フルオロウラシル	250mg	生食適量	48hr 持続注入
	1000mg		
⑤アバスチン	100mg	生食 100mL	下記参照/点滴
	400mg		
⑥ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	5%ブドウ糖液 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		



【備考】

⑤アバスチン 初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分

※プロイメンドまたは内服アプレピタントを併用する