

レジメン番号	0517	レジメン名	CBDCA+PEM+ペムブロリズマブ
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、アリムタ、キイトルーダ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	…Day21	Day1 ( / )
キイトルーダ 200mg/body	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
アリムタ(PEM) 500mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5 : Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

アロキシ 0.75mg/body	点滴	mg	↑	3週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑		↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①キイトルーダ	100mg	生食 100mL	30分/点滴
②アリムタ	100mg	生食 100mL	10分/点滴
	500mg		
③カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
④	アロキシ 0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート 3.3mg		
⑤ 生食	100mL		15分/点滴
⑥ 生食	50mL		5分/点滴
⑦ 生食	50mL		5分/点滴
⑧ プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴

投与時間≫ (30分) (15分) (30分) (5分) (15分) (10分) (60分) (5分)  
 投与順≫ ⑧ → ⑤ → ① → ⑥ → ④ → ② → ③ → ⑦ → 終了

【コメント】

⑧プロイメンド：内服アプレピタント（day1 125mg、day2以降 80mg）使用の場合は投与しない

