

レジメン番号	0016	レジメン名	EC
登録診療科	乳腺外科	使用薬剤	エピルビシン、エンドキサン
がん腫	乳癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
エピルビシン(EPI) 90mg/m ²	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
エンドキサン(CPA) 600mg/m ²	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

プロイメンド 150mg/body	点滴	mg	↑	3週間を1コース	↑
A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑		↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①エピルビシン	10mg	生食 100mL	10分/点滴
	50mg		
②エンドキサン	100mg	生食 100mL	30分/点滴
	500mg		
③ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
④プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑤生食	50ml		5分/点滴

投与間隔>> (30分) (15分) (10分) (30分) (5分)
 投与順番>> ④ → ③ → ① → ② → ⑤ → 終了

【備考】

④プロイメンド：内服アプレピタント（day1 125mg、day2以降 80mg）使用の場合は投与しない