

レジメン番号	0462	レジメン名	Aflibercept+FOLFIRI
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	ザルトラップ、フルオロウラシル、レボホリナート、トポテシン
がん腫	大腸癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	…Day14	Day1 ( / )
レボホリナート(I-LV) 200mg/ m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
フルオロウラシル (5FU) 400mg/ m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓
トポテシン(CPT-11) 150mg/ m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル (5FU) 2400mg/ m <sup>2</sup>	持続 注入	mg	↓		↓
ザルトラップ 4mg/kg	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑	2週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① レボホリナート	25mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
	100mg		
② フルオロウラシル	25mg	生食 50mL	5分/点滴
	100mg		
②' フルオロウラシル	25mg	生食適量	46hr 持続注入
	100mg		
③ トポテシン	40mg	5%ブドウ糖液 250mL	90分/点滴
	100mg		
④ ザルトラップ	40mg	生食 100mL	60分/点滴
	100mg		
⑤ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		



【備考】