

レジメン番号	0165	レジメン名	Cetuximab+CPT-11 biweekly
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	アービタックス、トポテシン
がん腫	大腸癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	…Day14	Day1 (/)
トポテシン(CPT-11) 150mg/m ² /日	点滴	mg	↓		2週間を1コース	↓
アービタックス(Cetuximab) 初回 400mg/ m ² /日 以後 250mg/ m ² /日	点滴	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑		2週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	mg	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①トポテシン	40mg	5%ブドウ糖液 250mL	90分/点滴
	100mg		
②アービタックス	100mg	生食 250mL	※1 下記参照/点滴
③	アロキシ	生食 100mL	15分/点滴
	または グラニセトロン		
	デキサート		
	ネオレスタール		
④ 生食	100ml	生食 100ml	30分/点滴
⑤ 生食	100ml	生食 100ml	※2 下記参照/点滴

(Day1)

投与間隔≫ (15分) (30分) (※1 下記参照) (※2 下記参照) (90分)

投与順番≫ ③ → ④ → ② → ⑤ → ① → 終了

(Day8)

投与間隔≫ (15分) (30分) (※1 下記参照) (※2 下記参照)

投与順番≫ ③ → ④ → ② → ⑤ → 終了

【備考】

※1 ②アービタックス 初回 120分/2回目以降 60分

※2 アービタックス投与終了後からトポテシン投与開始までの時間(生食⑤の投与時間)：初回 60分/2回目以降 15分