レジメン番号	0199	レジメン名	Panitumumab + CPT-11 biweekly
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	ベクティビックス、トポテシン
がん腫	大腸癌	インターバル日数	14 日

## 【投与量・投与スケジュール】

<b>薬品名</b> 投与量/体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 ( / )	···Day14	Day1 ( / )
トポテシン <b>(CPT-11)</b> 150mg/ m <sup>2</sup>	点滴	mg	<b>\</b>		$\downarrow$
ベクティビックス ( <b>Panitumumab)</b> 6mg/kg	点滴	mg	↓	2 週間を 1 コース	↓
(支持療法)					
A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	1	2 週間を 1 コース	<b>↑</b>
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	<b>↑</b>	4 週間で1コーハ	<b>↑</b>

## 【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法	
①トポテシン	40mg 100mg	5%ブドウ糖液 250mL	90 分/点滴	
② ベクティビックス	100mg	生食 100mL	60 分/点滴	
アロキシまたは	0.75mg			
③ グラニセトロン エルー	1mg	生食 100mL	30 分/点滴	
デキサート	3.3mg			
④ 生食	250ml	生食 250ml	下記参照/点滴	

投与間隔≫		(30分)	(60分)	(下記参照)	(90分)	
投与順番》	3	$\longrightarrow$ ②	$\longrightarrow$ 4	<b>→</b> ①	<b>→</b>	終了

## 【備考】

ベクティビックス投与終了からトポテシン投与開始までの時間(生食④の投与時間)初回 60 分/2 回目以降 15 分