

レジメン番号	0578	レジメン名	頸癌 TC 療法
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	パクリタキセル、カルボプラチン
がん腫	子宮頸癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	…Day21	Day1 ( / )
パクリタキセル(PTX) 175mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5 : Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓

支持療法

デキサート 19.8mg/body	点滴	19.8mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑
A)グラニセトロン(1) B)アロキシ(0.75)	点滴	を mg	↑		↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	150mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①パクリタキセル	30mg	生食 500mL	3 時間/点滴
	100mg		
②カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60 分/点滴
	150mg		
③プロイメンド	150mg	生食 250mL	30 分/点滴
④	デキサート	生食 100mL	15 分/点滴
	ファモチジン		
	ネオレスタール		
⑤	グラニセトロン または	生食 100mL	30 分/点滴
	アロキシ		
⑥生食	50mL		5 分/点滴
⑦生食	50mL		5 分/点滴

投与  
間隔>> (30分) (15分) (30分) (5分) (3時間) (60分) (5分)  
投与  
順番>> ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ① → ② → ⑦ → 終了

【備考】

③プロイメンド：内服アプレピタント (day1 125mg、day2以降80mg) 使用の場合は投与しない