


|        |        |          |   |
|--------|--------|----------|---|
| レジメン番号 | 0004   | レジメン名    | R±CHOP-21   |
| 登録診療科  | 血液内科   | 使用薬剤     | リツキサン/リツキシマブ BS、<br>エンドキサン、ドキシソルビシン、<br>オンコピン、プレドニゾロン |
| がん腫    | 悪性リンパ腫 | インターバル日数 | 21 日  |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名<br>投与量/体表面積                                    | 患者投与量 | 投与方法 | Day-1<br>( / ) | Day0<br>( / ) | Day1<br>( / ) | …21                       | Day1<br>( / ) |
|--|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| リツキサン/リツキシマブ BS<br>375 mg/m <sup>2</sup>           | mg    | 点滴   | ↓              |               |               | コース day20 or day21<br>に投与 |               |
| エンドキサン(CPA)<br>750mg/m <sup>2</sup>                | mg    | 点滴   |                |               | ↓             | 3 週間を 1 コース               | ↓             |
| ドキシソルビシン(DXR)<br>50mg/m <sup>2</sup>               | mg    | 点滴   |                |               | ↓             |                           | ↓             |
| オンコピン(VCR)<br>1.4mg/m <sup>2</sup> (最大 2mg/body)   | mg    | 静注   |                |               | ↓             |                           | ↓             |
| プレドニゾロン(PSL)<br>100mg/body または 50mg/m <sup>2</sup> | mg    | 経口   |                |               | D1~5          |                           | D1~5          |

(支持療法)

※1 Day-1 経口剤あり

|                                      |  |    |  |  |   |  |   |
|--------------------------------------|--|----|--|--|---|--|---|
| A) アロキシ (0.75mg)<br>B) グラニセトロン (1mg) |  | 点滴 |  |  | ↑ |  | ↑ |
|--------------------------------------|--|----|--|--|---|--|---|

【当日の投与方法】

| 薬品名                      | 規格     | 希釈液/量       | 投与速度/方法       |
|--------------------------|--------|-------------|---------------|
| ①リツキサン/リツキシマブ BS         | 100mg  | 生食で 10 倍に希釈 | ※2 下記参照/輸注ポンプ |
|                          | 500mg  |             |               |
| ②エンドキサン                  | 100mg  | 生食 250ml    | 60 分/点滴       |
|                          | 500mg  |             |               |
| ③ドキシソルビシン                | 10mg   | 生食 100ml    | 15 分/点滴       |
|                          | 50mg   |             |               |
| ④オンコピン                   | 1mg    | 生食 50ml     | 5 分/点滴        |
| ⑤ アロキシ<br>または<br>グラニセトロン | 0.75mg | 生食 100ml    | 15 分/点滴       |
|                          | 1mg    |             |               |

【day-1】

投与間隔≫ ※3 (メインルート/  
持続)

投与順番≫ ⑧ → ① → 終了

【day1】

投与間隔≫ ※4 (メインルート/  
持続) (側管 15 分) (側管 5 分) (側管 15 分) (側管 60  
分)

投与順番≫ ⑦ → ⑤ → ④ → ③ → ② → 終了

【備考】

※1 リツキサン/リツキシマブ BS 投与前、解熱鎮痛剤及び抗ヒスタミン剤の予防投与を行う

※2 初回投与時は、最初の 30 分は 50mg/時の速度で点滴静注を開始し、患者の状態を十分観察しながら、

その後注入速度を 30 分毎に 50mg/時ずつ上げて、最大 400mg/時まで速度を上げることができる。

また、2 回目以降の注入開始速度は、初回投与時に発 現した副作用が軽微であった場合、100mg/時まで上げて

開始し、その後 30 分毎に 100mg/時ずつ上げて、最大 400mg/時まで上げることができる。

※3 ⑧メインルート：リツキサン用 5%ブドウ糖 500 mL

※4 ⑦メインルート：KN3 号 500mL+メイロン 20mL(2A)、上記はすべて側管から投与する。