レジメン番号	0084	**レジメン名**	sLV5FU2
登録診療科	総合消化器外科	**使用薬剤**	レボホリナート、フルオロウラシル
がん腫	大腸癌	**インターバル日数**	14 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	･･･Day14	Day1 (/)
レボホリナート(l-LV) 200mg/ m²	点滴	mg	↓	2 週間を 1 コース	↓
フルオロウラシル（5FU) 400mg/ m²	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル（5FU) 2400mg/ m²	持続注入	mg	↓		↓

（支持療法）

A)アロキシ(0.75) **B)グラニセトロン(1)**	点滴	mg	↑		↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
① **レボホリナート**		25mg 100mg	5%ブドウ糖液 250mL	120 分/点滴
② **フルオロウラシル**		250mg 1000mg	生食 50mL	5 分/点滴
③ **フルオロウラシル**		250mg 1000mg	生食適量	46hr 持続注入
④	**アロキシ** または **グラニセトロン**	0.75mg 1mg	生食 100mL	30 分/点滴
	デキサート	3.3mg		

投与間隔≫　　(30 分)　　(120 分)　　①終了後　　（全開）　　46 時間（持続注入 ）

投与順番≫　④ → ① → ② → ③ → 終了

【備考】