レジメン番号	0140	**レジメン名**	mFOLFOX6
登録診療科	消化器内科	**使用薬剤**	レボホリナート、フルオロウラシル、エルプラット
がん腫	大腸癌	**インターバル日数**	14 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	･･･Day14	Day1 (/)
レボホリナート(l-LV) 200mg/ m²/日	点滴	mg	↓	2 週間を 1 コース	↓
フルオロウラシル(5FU) 400mg/ m²/日	点滴	mg	↓		↓
エルプラット(L-OHP) 85mg/ m²/日	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル(5FU) 2400mg/ m²/日	持続注入	mg	↓		↓

（支持療法）

A)アロキシ(0.75) **B)グラニセトロン(1)**	点滴	mg	↑	2 週間を 1 コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①レボホリナート		100mg 25mg	5%ブドウ糖液 250mL	120 分/点滴
②　フルオロウラシル		250mg	5%ブドウ糖液 100mL	全開/点滴
②´フルオロウラシル		250mg	生食適量	46hr 持続注入
③エルプラット		100mg	5%ブドウ糖液 250mL	120 分/点滴
④	**アロキシ**	0.75mg	5%ブドウ糖液 100mL	30 分/点滴
	グラニセトロン または	1mg		
	デキサート	3.3mg		

投与間隔≫　　(30 分)　　(120 分)　　（全開）　　46 時間 (持続注入)

投与順番≫　④ ⟶ ③ ⟶ ① ⟶ ② ⟶ ②´ ⟶ 終了

【備考】