| | | | |
|---|---|---|---|
| **レジメン番号** | 0147 | **レジメン名** | CPT-11 |
| **登録診療科** | 呼吸器内科 | **使用薬剤** | トポテシン |
| **がん腫** | 小細胞・非小細胞肺癌 | **インターバル日数** | 28 日 |

【投与量・投与スケジュール】

| **薬品名**<br>投与量／体表面積 | 投与<br>方法 | 患者投与量 | Day1<br>( / ) | Day8<br>( / ) | Day15<br>( / ) | ･･･Day28 | Day1<br>( / ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **トポテシン(CPT-11)**<br>100mg/m² | 点滴 | mg | ↓ | ↓ | ↓ | 4 週間を 1 コース | ↓ |

**(支持療法)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A)アロキシ**(0.75)<br>**B)グラニセトロン**(1) | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | ↑ | 4 週間を 1 コース | ↑ |
| **デキサート**<br>6.6mg/body | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | ↑ | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | | | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① トポテシン | | | 40mg<br>100mg | 生食 500mL | 90 分/点滴 |
| ② | アロキシ | または | 0.75mg | 生食 100mL | 15 分/点滴 |
| | グラニセトロン | | 1mg | | |
| | デキサート | | 3.3mg | | |
| ③生食 | | | 50mL | | 5 分/点滴 |

投与間隔≫　　(15 分 )　　( 90 分)　　( 5 分)

投与順番≫　② ⟶ ① ⟶ ③ ⟶ 終了

【備考】