

レジメン番号	0213	レジメン名	PLD+CBDCA
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	ドキシル、カルボプラチン
がん腫	卵巣癌	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day28	Day1 (/)
ドキシル(PLD) 30mg/m ²	点滴	mg	↓	4週間を1コース	↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5: Calvert式)	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	 mg	↑	4週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ドキシル	20mg	5%ブドウ糖液 250mL	60分/点滴
② カルボプラチン	50mg	生食 500mL	120分/点滴
	150mg		
② アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		

投与間隔>> (15分) (60分) (120分)
 投与順番>> ③ → ① → ② → 終了

【備考】

.....

.....

.....

.....

.....