

| | | | |
|--------|---------|----------|---------------|
| レジメン番号 | 0214 | レジメン名 | GEM+CDDP |
| 登録診療科 | 総合消化器外科 | 使用薬剤 | ジェムザール、シスプラチン |
| がん腫 | 胆道癌 | インターバル日数 | 21日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | Day8 (/) | …Day21 | Day1 (/) |
|--------------------------------------|------|-------|---------------|---------------|----------|---------------|
| シスプラチン(CDDP) 25mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | ↓ | 3週間を1コース | ↓ |
| ジェムザール(GEM) 1000mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | ↓ | | ↓ |

(支持療法)

| | | | | | | |
|------------------------------|----|----|---|---|----------|---|
| A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1) | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | 3週間を1コース | ↑ |
| デキサート 6.6mg/body | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | | ↑ |
| 硫酸マグネシウム 0.4A/body | 点滴 | | ↑ | ↑ | | ↑ |
| ラシックス 10mg/body | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|--|--------|----------|---------|
| ① シスプラチン | 10mg | 生食 500ml | 60分/点滴 |
| | 25mg | | |
| | 50mg | | |
| ② ジェムザール | 200mg | 生食 100ml | 30分/点滴 |
| | 1000mg | | |
| ③ アロキシ または グラニセトロン または デキサート | 0.75mg | 生食 100ml | 15分/点滴 |
| | 3mg | | |
| | 3.3mg | | |
| ④ 硫酸マグネシウム | | 生食 500ml | 60分/点滴 |
| ⑤ ラシックス | 20mg | 生食 250ml | 30分/点滴 |
| ⑥ 生食 | 500mL | | 60分/点滴 |

投与間隔≫ (15分) (30分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番≫ ③ → ② → ④ → ⑤ → ① → ⑥ → 終了

【備考】
