

レジメン番号	0223	レジメン名	Azacitidine
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ビダーザ
がん腫	骨髄異形成症候群	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	Day4 (/)	Day5 (/)	Day6 (/)	Day7 (/)	…Day28	Day1 (/)
ビダーザ(Azacitidine) 75mg/m ² /日	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	4週間を 1コース	↓

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1) アロキシの場合は1回/週	点滴	○ mg	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4週間を 1コース	↑
--	----	---------	---	---	---	---	---	---	---	--------------	---

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ビダーザ	100mg	生食 50ml	10分/点滴
② アロキシ グラニセトロン	0.75mg 1mg	または 生食 50ml	全開/点滴

投与間隔≫ ※1 (メインルート/持続) (側管/全開) (側管/10分)

投与順番≫ ③ → ② → ① → 終了

【備考】

※1 ③メインルート：生理食塩液 250 mL