

レジメン番号	0225	レジメン名	PEM+Bev
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	アリムタ、アバスチン
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	・・・Day21	Day1 ( / )
アリムタ(PEM) 500mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
アバスチン(Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑	3週間を1コース	↑
A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アリムタ	100mg	生食 100mL	10分/点滴
	500mg		
②アバスチン	100mg	生食 100mL	※下記参照/点滴
	400mg		
③ デキサート アロキシ グラニセトロン	3.3mg	生食 100mL	15分/点滴
	0.75mg		
	1mg		
④生食	50mL		5分/点滴

投与時間≫ ※下記参照 (15分) (10分) (5分)  
 投与順≫ ② → ③ → ① → ④ → 終了

【備考】

※アバスチン投与速度：初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分