

| | | | |
|--------|------|----------|--------------|
| レジメン番号 | 0395 | レジメン名 | mTN 療法 |
| 登録診療科 | 産婦人科 | 使用薬剤 | パクリタキセル、アクプラ |
| がん腫 | 卵巣癌 | インターバル日数 | 21 日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | …Day21 | Day1 (/) |
|--------------------------------------|------|-------|---------------|-------------|---------------|
| パクリタキセル(PTX) 175mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | 3 週間を 1 コース | ↓ |
| アクプラ(NED) 70mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | | ↓ |

(支持療法)

| | | | | | |
|----------------------|----|--------|---|-------------|---|
| デキサート 19.8mg/body | 点滴 | 19.8mg | ↑ | 3 週間を 1 コース | ↑ |
| ファモチジン 20mg/body | 点滴 | 20mg | ↑ | | ↑ |
| ネオレストール 10mg/body | 点滴 | 10mg | ↑ | | ↑ |
| グラニセトロン 1mg/body | 点滴 | 1mg | ↑ | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|-----------|---------|----------|---------|
| ①パクリタキセル | 30mg | 生食 500mL | 3 時間/点滴 |
| | 100mg | | |
| ②アクプラ | 50mg | 生食 500mL | 2 時間/点滴 |
| ③ | デキサート | 生食 100mL | 15 分/点滴 |
| | ファモチジン | | |
| | ネオレストール | | |
| ④ グラニセトロン | 10mg | 生食 100mL | 30 分/点滴 |
| ⑤ 生食 | 50mL | | 5 分/点滴 |

投与間隔≫ (15分) (30分) (3時間) (2時間) (5分)
 投与順番≫ ③ → ④ → ① → ② → ⑤ → 終了

【備考】

.....

.....

.....