

レジメン番号	0272	レジメン名	CDDP+S-1
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、エスワンタイホウ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	35日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1~7 ( / ~ / )	Day8 ( / )	Day9~21 ( / ~ / )	・・・Day35	Day1 ( / )
シスプラチン(CDDP) 60mg/m <sup>2</sup> /日	点滴	mg		↓		5週間を1コース	
エスワンタイホウ(S-1) ※下記参照	経口	mg	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ mg		↑	5週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg		↑		↑
硫酸Mg 0.4A/body	点滴	0.4A		↑		↑
マンニトール 200mL/body	点滴	200mL		↑		↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	mg		↑		

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①	シスプラチン	10mg	生食 500mL	60分/点滴
		25mg		
		50mg		
②	アロキシ	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	または グラニセトロン	1mg		
	デキサート	3.3mg		
③	硫酸Mg		生食 500mL	60分/点滴
④	マンニトール	300mL		30分/点滴
⑤	プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑥	生食	500mL		60分/点滴

投与間隔≫ (30分) (15分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番≫ ⑤ → ② → ③ → ④ → ① → ⑥ → 終了

【備考】

S-1 : Day1~Day21 に内服 (3週服薬 2週間休薬)

S-1 投与量 : BSA 1.25 m<sup>2</sup>未満 → 80mg/day

BSA 1.25 m<sup>2</sup>~ → 100mg/day

BSA 1.5 m<sup>2</sup>~ → 120mg/day

⑤プロイメンド : 内服アプレピタント (day1 125mg、day2以降 80mg) 使用の場合は投与しない