

レジメン番号	0531	レジメン名	PCE 療法
登録診療科	臨床腫瘍科	使用薬剤	パクリタキセル、カルボプラチン、 アービタックス
がん腫	頭頸部癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	…Day21	Day1 (/)
パクリタキセル(PTX) 100mg/m ²	点滴	mg	↓	↓		3 週間を 1 コース	↓
カルボプラチン (AUC=2.5 : Calvert 式)	点滴	mg	↓	↓			↓
アービタックス 初回 400mg/m ² 、以降 250mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

デキサート 9.9mg/body(1 コース Day1) 6.6mg/body(1 コース目 Day8 以降, 2 コース目以降)	点滴	初回 9.9mg 2 回目以降 6.6mg	↑	↑	↑	3 週間を 1 コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	mg	↑	↑			↑
ネオレストール 10mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	mg	↑	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①	パクリタキセル	30mg	生食 250mL	60 分/点滴
		100mg		
②	カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60 分/点滴
		150mg		
③	アービタックス	100mg	生食 450mL(初回)	※下記参照
			生食 250mL(以降)	
④	デキサート	1 コース目 Day1	生食 100mL	15 分/点滴
		1 コース目 Day8 以降 2 コース目以降		
	ファモチジン	Day1,Day8 のみ		
	ネオレストール			
⑤	グラニセトロン	1mg	生食 100mL	30 分/点滴
⑥	生食	100 mL		30 分/点滴
⑦	生食	50 mL		5 分/点滴
⑧	生食	250mL		60 分/点滴

(Day1,8)

投与間隔≫ (15 分) (30 分) (60 分) (60 分) (5 分) (※) (60 分)

投与順番≫ ④ → ⑤ → ① → ② → ⑦ → ③ → ⑧ → 終了

(Day15)

投与間隔≫ (15 分) (30 分) (※) (60 分)

投与順番≫ ④ → ⑥ → ③ → ⑧ → 終了

【備考】

※アービタックス投与速度：初回 120 分/2 回目以降 60 分まで短縮可能