

レジメン番号	0240	レジメン名	AMR+CBDCA 療法
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	カルセド、カルボプラチン
がん腫	子宮頸癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	…Day21	Day1 (/)
カルセド(AMR) 30mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	3 週間を 1 コース	↓
カルボプラチン CBDCA (AUC=4 : Calvert 式)	点滴	mg	↓				↓

(支持療法)

デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑			3 週間を 1 コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg		↑	↑		
A) アロキシ(0.75) day1 のみ B) グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑	(↑)	(↑)		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①カルセド		20mg	生食 100mL	30 分/点滴
②カルボプラチン		50mg 150mg	生食 500mL(0.8V)	120 分/点滴
③	アロキシ	または	0.75mg	生食 100mL
	グラニセトロン		1mg	
	デキサート(Day1)	3.3mg		
	デキサート(Day2,3)	3.3mg		

投与間隔≫ (30分) (30分) (120分)
 投与順番≫ ③ → ① → ② → 終了

【備考】

