

レジメン番号	0274	レジメン名	CDDP+CPT-11
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、トポテシン
がん腫	小細胞肺癌	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	…Day28	Day1 (/)
トポテシン (CPT-11) 60mg/m ² /日	点滴	mg	↓	↓	↓	4週間を1コース	↓
シスプラチン (CDDP) 60mg/m ² /日	点滴	mg	↓				↓

(支持療法)

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ mg	↑	↑	↑	4週間を1コース	↑
デキササート 9.9mg/body(Day1) 6.6mg/body(Day8・15)	点滴	mg	↑	↑	↑		↑
硫酸Mg 0.4A/body	点滴	mg	↑				↑
マンニトール 200mL/body	点滴	mg	↑				↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	mg	↑				↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①トポテシン	40mg	生食 500mL	90分/点滴
	100mg		
②シスプラチン	10mg	生食 500mL	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
③ アロキシ または グラニセトロン デキササート(day1) デキササート(day8・15)	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
	3.3mg		
④ 硫酸Mg		生食 500mL	60分/点滴
⑤ プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑥ マンニトール	300mL		30分/点滴
⑦ 生食	500mL		60分/点滴
⑧ 生食	50mL		5分/点滴

(day1)

投与間隔≫ (30分) (15分) (90分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番≫ ⑤ → ③ → ① → ④ → ⑥ → ② → ⑦ → 終了

(day8・15)

投与間隔≫ (15分) (90分) (5分)

投与順番≫ ③ → ① → ⑧ → 終了

【備考】

⑤プロイメンド：内服アプレピタント (day1 125mg、day2以降 80mg) 使用の場合は投与しない