

レジメン番号	0284	レジメン名	CDDP+PEM+Bev
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、アリムタ、アバスチン
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	・・・Day21	Day1 ( / )
アリムタ(PEM) 500mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	3週間を1コースとする	↓
シスプラチン(CDDP) 75 mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓
アバスチン(Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑	3週間を1コースとする	↑
A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑		↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アリムタ	100mg	生食 100mL	10分/点滴
	500mg		
②シスプラチン	10mg	生食 500mL	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
③アバスチン	100mg	生食 100mL	※下記参照/点滴
	400mg		
④ デキサート アロキシ グラニセトロン または	3.3mg	生食 100mL	15分/点滴
	0.75mg		
	1mg		
⑤プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑥硫酸 Mg		生食 500mL	60分/点滴
⑦マンニトール	300mL		30分/点滴
⑧生食	500mL		60分/点滴

投与時間≫ (※下記参照) (30分) (15分) (10分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順≫ ③ → ⑤ → ④ → ① → ⑥ → ⑦ → ② → ⑧ → 終了

【備考】

※アバスチン投与速度：初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分

⑤プロイメンド：内服アプレピタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない