

レジメン番号	0287	レジメン名	Rituximab
登録診療科	腎内科	使用薬剤	リツキサン、リツキシマブ
がん腫	ANCA 関連血管炎	インターバル日数	7 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	…Day7	Day1 ( / )
リツキサン 375 mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	1 週間を 1 コース	↓

(支持療法)

※1 経口薬剤あり

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① リツキサン	100mg	生食で 10 倍希釈	※2 下記参照/輸注ポンプ
	500mg		
② 5%ブドウ糖液	500mL		メインルート/点滴

投与間隔>

(メインルート)

(※2 指示通り/側管)

投与順番>

②

→

①

→

終了

【備考】

※1 解熱鎮痛剤及び抗ヒスタミン剤の予防投与を行う

※2 初回投与時は、最初の 30 分は 50mg/時の速度で点滴静注を開始し、患者の状態を十分観察しながら、

その後注入速度を 30 分毎 に 50mg/時ずつ上げて、最大 400mg/時まで速度を上げることができる。

また、2 回目以降の注入開始速度は、初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、100mg/時まで上げて

開始し、その後 30 分毎に 100mg/時ずつ上げて、最大 400mg/時まで上げることができる。