

レジメン番号	0516	レジメン名	CDDP+PEM+ペンプロリズマブ
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、アリムタ、キイトルーダ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
キイトルーダ 200mg/body	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
アリムタ(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
シスプラチン(CDDP) 75mg/m ²	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

アロキシ 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑	3週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	150mg	↑		↑
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	0.4A	↑		↑
マンニトール 200mL/body	点滴	200mL	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①キイトルーダ	100mg	生食 100mL	30分/点滴
②アリムタ	100mg	生食 100mL	10分/点滴
	500mg		
③シスプラチン	10mg	生食 300mL	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
④	アロキシ 0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート 3.3mg		
⑤プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑥生食	100mL		15分/点滴
⑦生食	50mL		5分/点滴
⑧硫酸マグネシウム	20mL	生食 500mL	60分/点滴
⑨マンニトール	300mL		30分/点滴
⑩生食	500mL		60分/点滴

投与時間≫ (15分) (30分) (5分) (30分) (15分) (10分)

投与順≫ ⑥ → ① → ⑦ → ⑤ → ④ → ② →

(60分) (30分) (60分) (60分)

⑧ → ⑨ → ③ → ⑩ → 終了

【備考】

⑤ プロイメンド：内服アプレピタント（day1 125mg、day2 以降 80mg）使用の場合は投与しない