

レジメン番号	0521	レジメン名	CBDCA+PTX+BV+アテゾリズマブ
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、パクリタキセル、アバスチン、テセントリク
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	…Day21	Day1 ( / )
テセントリク 1200mg/body	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
パクリタキセル(PTX) 175mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=6 : Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓
アバスチン(Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓		↓

支持療法

デキサート 19.8mg/body	点滴	19.8mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	150mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①テセントリク	1200mg	生食 250mL	下記参照(※1)/点滴
②パクリタキセル	30mg	生食 500mL	180 分/点滴
	100mg		
③カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60 分/点滴
	150mg		
④アバスチン	100mg	生食 100mL	下記参照(※2)/点滴
	400mg		
⑤	デキサート 3.3mg	生食 100mL	15 分/点滴
	ファモチジン 20mg		
	ネオレスタール 10mg		
⑥グラニセトロン	1mg	生食 100mL	30 分/点滴
⑦プロイメンド	150mg	生食 250mL	30 分/点滴
⑧ 生食	100mL		15 分/点滴
⑨ 生食	50mL		5 分/点滴
⑩ 生食	50mL		5 分/点滴

投与間隔>> (15分) (※1) (5分) (※2) (30分) (15分) (30分) (180分) (60分) (5分)

投与順番>> ⑧ → ① → ⑨ → ④ → ⑦ → ⑤ → ⑥ → ② → ③ → ⑩ → 終了

【備考】

※1 テセントリク投与速度：初回 60 分/2 回目以降 30 分

※2 アバスチン投与速度：初回 90 分/2 回目 60 分/3 回目以降 30 分

⑦ プロイメンド：内服アプレピタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない

