

|        |       |          |          |
|--------|-------|----------|----------|
| レジメン番号 | 0535  | レジメン名    | AMR(胸腺癌) |
| 登録診療科  | 呼吸器内科 | 使用薬剤     | カルセド     |
| がん腫    | 胸腺癌   | インターバル日数 | 21日      |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名<br>投与量/体表面積                  | 投与方法 | 患者投与量 | Day1<br>( / ) | Day2<br>( / ) | Day3<br>( / ) | …Day21   | Day1<br>( / ) |
|----------------------------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| カルセド(AMR)<br>40mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | mg    | ↓             | ↓             | ↓             | 3週間を1コース | ↓             |

(支持療法)

|                                      |    |           |   |     |     |          |   |
|--------------------------------------|----|-----------|---|-----|-----|----------|---|
| A) アロキシ(0.75)day1のみ<br>B) グラニセトロン(1) | 点滴 | ○ を<br>mg | ↑ | (↑) | (↑) | 3週間を1コース | ↑ |
| デキサート<br>6.6mg/body                  | 点滴 | mg        | ↑ | ↑   | ↑   |          | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名                                  | 規格     | 希釈液/量    | 投与速度/方法 |
|--------------------------------------|--------|----------|---------|
| ①カルセド                                | 20mg   | 生食 100mL | 15分/点滴  |
| ②<br>アロキシ<br>または<br>グラニセトロン<br>デキサート | 0.75mg | 生食 100mL | 15分/点滴  |
|                                      | 1mg    |          |         |
|                                      | 3.3mg  |          |         |
| ③ 生食                                 | 50mL   |          | 5分/点滴   |

投与時間>> (15分) (15分) (5分)  
 投与順>> ② → ① → ③ → 終了

【備考】