

レジメン番号	0604	レジメン名	リツキサン単剤療法(PRCA)
登録診療科	血液内科	使用薬剤	リツキサン/リツキシマブ BS
がん腫	赤芽球瘍	インターバル日数	7日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day7	Day1 (/)
リツキサン/リツキシマブ BS 375 mg/m ²	点滴	mg	↓	1週を1コースとして 4コース繰り返す	↓

(支持療法)

※1 Day1 経口剤あり

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①リツキサン/リツキシマブ BS	100mg 500mg	生食で10倍希釈	※2 下記参照/輸注ポンプ

投与間隔≫ (メインルート/
持続) (※2)

投与順番≫ ② → ① → 終了

【備考】

※1 リツキサン/リツキシマブ BS 投与前、解熱鎮痛剤及び抗ヒスタミン剤の予防投与を行う

※2 初回投与時は、最初の30分は50mg/時の速度で点滴静注を開始し、患者の状態を十分観察しながら、

その後注入速度を30分毎に50mg/時ずつ上げて、最大400mg/時まで速度を上げることができる。

また、2回目以降の注入開始速度は、初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、100mg/時まで上げて

開始し、その後30分毎に100mg/時ずつ上げて、最大400mg/時まで上げることができる。

② 5%ブドウ糖液 500mL (メインルート)