

レジメン番号	0615	レジメン名	Nal-IRI+5FU/l-LV
登録診療科	消化管内科Ⅱ・ 総合消化器外科	使用薬剤	オニバイド、フルオロウラシル、レボホリナート
がん腫	膵臓癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	…Day14	Day1 ( / )
オニバイド(Nal-IRI) 70mg/ m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
レボホリナート(l-LV) 200mg/ m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル(5-FU) 2400mg/ m <sup>2</sup>	持続注入	mg	↓		↓

(支持療法)

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑	2週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑		↑

【当日の投与方法】、フルオロウラシル

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① オニバイド	43mg	5%ブドウ糖液 500mL	90分/点滴
② レボホリナート	25mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
	100mg		
③ フルオロウラシル	1000mg	生食適量	46時間 持続注入
	250mg		
④ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
⑤ 生食	50mL		5分/点滴



【備考】

---



---



---



---



---



---



---



---