

| | | | |
|--------|---------|----------|----------|
| レジメン番号 | 0510 | レジメン名 | ガザイバ維持療法 |
| 登録診療科 | 血液内科 | 使用薬剤 | ガザイバ |
| がん腫 | 濾胞性リンパ腫 | インターバル日数 | 56日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者 投与量 | Day1 (/) | …Day56 | Day1 (/) |
|----------------------|------|-----------|---------------|----------|---------------|
| ガザイバ 1000 mg/body | 点滴 | 1000mg | ↓ | 8週間を1コース | ↓ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|--------|--------|----------|-------------|
| ① ガザイバ | 1000mg | 生食 210mL | ※下記参照/輸注ポンプ |
| ② 生食 | 500mL | | メインルート/点滴 |

投与間隔>> メインルート (側管※)
投与順番>> ② → ① → 終了

【備考】

※ガザイバ投与速度：【初回】50mg/hr で開始、30分毎に50mg/hr ずつ速度上昇させ最大400mg/hr まで

上げることができる。【2回目以降】前回の投与でGrade2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合は、

100mg/hr で投与を開始し、30分毎に100mg/hr ずつ、最大400mg/hr まで上げることができる。

・ガザイバ開始30分～1時間前に、d-クロルフェニラミン徐放錠6mg, アセトアミノフェン錠500mgを服用