

レジメン番号	0513	レジメン名	A+AVD 療法
登録診療科	血液内科	使用薬剤	アドセトリス、ドキシソルビシン、 エクザール、ダカルバジン
がん腫	ホジキンリンパ腫	インターバル日数	14 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 ( / )	…Day14	Day1 ( / )
ドキシソルビシン(ADR) 25mg/m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓	2 週間を 1 コース	↓
エクザール(VBL) 6mg/m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓		↓
ダカルバジン(DTIC) 375mg/m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓		↓
アドセトリス 1.2mg/kg/日	点滴	mg	↓		↓
(支持療法)					
A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン (1)	点滴	 を mg	↑	2 週間を 1 コース	↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ドキシソルビシン	10mg	生食 100mL	30 分/点滴
	50mg		
② エクザール	10mg	生食 50mL	5 分/点滴
③ ダカルバジン	100mg	生食 100mL	30 分/点滴
④ アドセトリス	50mg	生食 100mL	30 分/点滴
⑤ 注射用蒸留水	100mL		アドセトリス溶解用
⑥ アロキシ または グラニセトロン	0.75mg	生食 100mL	15 分/点滴
	1mg		
⑦ 生食	50mL		5 分/点滴
⑧ 生食	500mL		メインルート/点滴

投与間隔≫                      側管                      側管                      側管                      側管                      側管                      側管

  メインルート            15 分            30 分            5 分            30 分            5 分            30 分

投与順番≫ ⑧ → ⑥ → ① → ② → ③ → ⑦ → ④ → 終了

【備考】

---



---