

レジメン番号	0529	レジメン名	mCyBorD(Bor,CPA 点滴)療法
登録診療科	血液内科	使用薬剤	デキサート、ベルケイド、エンドキサン
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	35 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	Day22 (/)	…Day35	Day1 (/)
デキサート 16.5mg/body	点滴	16.5mg	↓	↓	↓	↓	5 週間を 1 コース	↓
ベルケイド 1.3mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	↓		↓
エンドキサン 300mg/ m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

グラニセトロン 1mg/body	静注	1mg	↑	↑	↑	↑	5 週間を 1 コース	↑
---------------------	----	-----	---	---	---	---	-------------	---

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① デキサート	3.3mg	生食 100mL	15 分/点滴
② ベルケイド	3mg	生食 50mL	5 分/点滴
③ エンドキサン	100mg	YD ソリタ T3 号 200mL	60 分/点滴
	500mg		
④ グラニセトロン	1mg	生食 4mL	静注
⑤ YD ソリタ T3 号	200mL		メインルート/点滴

投与間隔≫

(メインルート)

(側管 15 分)

(側管 5 分)

(静注)

(側管 60 分)

投与順番≫ ⑤

→

①

→

②

→

④

→

③

→

終了

【備考】

※デキサートは、Day2, Day9 に追加投与する場合もある。