

| | | | |
|--------|-------|----------|----------------------------------|
| レジメン番号 | 0534 | レジメン名 | ADOC |
| 登録診療科 | 呼吸器内科 | 使用薬剤 | ドキシソルビシン、シスプラチン、 オンコビン、エンドキサン |
| がん腫 | 胸腺癌 | インターバル日数 | 21日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | Day2 (/) | Day3 (/) | Day4 (/) | …Day21 | Day1 (/) |
|--|------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| ドキシソルビシン (ADR) 40mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | | | | 3週間を1コース | ↓ |
| シスプラチン(CDDP) 75mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | | | | | ↓ |
| オンコビン (VCR) 0.6mg/m ² | 点滴 | mg | | | ↓ | | | |
| エンドキサン (CPA) 700mg/m ² | 点滴 | mg | | | | ↓ | | |
| (支持療法) | | | | | | | | |
| アロキシ 0.75mg/body | 点滴 | 0.75mg | ↑ | | | | 3週間を1コース | ↑ |
| デキサート Day1 9.9mg/body Day3.Day4 6.6mg/body | 点滴 | 9.9mg (6.6mg) | ↑ | | ↑ | ↑ | | ↑ |
| プロイメンド 150mg/body | 点滴 | 150mg | ↑ | | | | | ↑ |
| 硫酸マグネシウム 0.4A/body | 点滴 | 0.4A | ↑ | | | | | ↑ |
| マンニトール 200mL/body | 点滴 | 200mL | ↑ | | | | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|-----------|------------------|----------|---------|
| ①ドキシソルビシン | 10mg | 生食 100mL | 15分/点滴 |
| | 50mg | | |
| ②シスプラチン | 10mg | 生食 350mL | 60分/点滴 |
| | 25mg | | |
| | 50mg | | |
| ③オンコビン | 1mg | 生食 100mL | 15分/点滴 |
| ④エンドキサン | 100mg | 生食 500mL | 120分/点滴 |
| | 500mg | | |
| ⑤ | アロキシ 0.75mg | 生食 100mL | 15分/点滴 |
| | デキサート 3.3mg | | |
| ⑥ | デキサート 3.3mg | 生食 100mL | 15分/点滴 |
| ⑦ | プロイメンド 150mg | 生食 250mL | 30分/点滴 |
| ⑧ | 生食 50mL | | 5分/点滴 |
| ⑨ | 硫酸マグネシウム 20mL | 生食 500mL | 60分/点滴 |
| ⑩ | マンニトール 200mL | | 30分/点滴 |
| ⑪ | 生食 500mL | | 60分/点滴 |

《Day1》

投与時間》 (30分) (15分) (15分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順》 ⑦ → ⑤ → ① → ⑨ → ⑩ → ② → ⑪ → 終了

《Day3》

投与時間》 (15分) (15分) (5分)

投与順》 ⑥ → ③ → ⑧ → 終了

《Day4》

投与時間》 (15分) (120分) (5分)

投与順》 ⑥ → ④ → ⑧ → 終了

【備考】

⑦ プロイメンド：内服アプレピタント（day1 125mg、day2 以降 80mg）使用の場合は投与しない