

レジメン番号	297	レジメン名	アバスチン+ddTC
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	アバスチン、パクリタキセル、 カルボプラチン
がん腫	卵巣癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day 8 (/)	Day 15 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
パクリタキセル(PTX) 80mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	3週間を1コース	↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5.5: Calvert式)	点滴	mg	↓				↓
アバスチン(Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓				↓

(支持療法)

デキサート 初回 9.9mg/body 2回目以降 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑	3週間を1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑		↑
A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①パクリタキセル		30mg	生食 250mL	60分/点滴
		100mg		
②カルボプラチン		50mg	生食 250mL	60分/点滴
		150mg		
③アバスチン		100mg	生食 100mL	※下記参照/点滴
		400mg		
④	デキサート	初回 9.9mg 2回目以降 6.6mg	生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン	20mg		
	ネオレスタール	10mg		
⑤	アロキシ	0.75mg	生食 100mL	30分/点滴
	グラニセトロン	1mg		
⑥ 生食		50mL		5分/点滴

投与間隔>> (※下記参照) (15分) (30分) (60分) (60分) (5分)
 投与順番>> ③ → ④ → ⑤ → ① → ② → ⑥ → 終了

【備考】

※アバスチン 初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分