

レジメン番号	0299	レジメン名	アバスチン+DC
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	アバスチン、ドセタキセル、カルボプラチン
がん腫	卵巣癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
アバスチン (Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
カルボプラチン (CBDCA) (AUC=5.5 : Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓
ドセタキセル (DTX) 70mg/m ²	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9 mg	↑	3週間を1コース	↑
A) アロキシ (0.75) B) グラニセトロン (1)	点滴	○ を mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アバスチン	100mg	生食 100mL	※下記参照/点滴
	400mg		
②カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
③ドセタキセル	20mg	生食 250mL	60分/点滴
	80mg		
④ デキサート アロキシ グラニセトロン	3.3mg	生食 100mL	15分/点滴
	0.75mg		
	1mg		
⑤ 生食	50mL		5分/点滴

投与間隔>> (※下記参照) (15分) (60分) (60分) (5分)
 投与順番>> ① → ④ → ③ → ② → ⑤ → 終了

【備考】

※アバスチン投与速度：初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分で投与可能。