

レジメン番号	0389	レジメン名	ベバシズマブ+テモダール療法
登録診療科	脳神経外科	使用薬剤	アバスチン、テモゾロミド
がん腫	悪性神経膠腫	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day14	Day1 (/)
アバスチン(Bev) 10mg/kg	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
テモゾロミド ※1 下記参照	経口	mg	※1 下記参照		

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① アバスチン	100mg	生食 100mL	※2 下記参照/点滴
	400mg		
② 生食	100ml		ルートキープ用

投与間隔> (ルートキープ用) (※2 下記参照)

投与順番> ② → ① → 終了

【備考】

※1 初発：テモゾロミド 75mg/m²/day 6週間内服後、4週間休薬。

その後、150mg/m²/day 5日間内服後、23日休薬（28日1クール）

次のクールでは、200mg/m²/day へ増量可。

再発：150mg/m²/day 5日間内服後、23日休薬（28日1クール）

次のクールでは、200mg/m²/day へ増量可。

※2 アバスチン投与速度：初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分まで短縮可能