

レジメン番号	0417	レジメン名	BEP 療法
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	ブレオ、シスプラチン、エトポシド
がん腫	卵巣胚細胞腫瘍	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	患者 投与量	投与 方法	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	Day4 (/)	Day5 (/)	Day9 (/)	ここまで 入院にて 実施	Day16 (/)	…Day21	Day1 (/)	
ブレオ(BLM) 30mg/body	30mg	点滴		↓				↓			↓	3 週間を 1 コース	
シスプラチン(CDDP) 20mg/m ²	mg	点滴	↓	↓	↓	↓	↓						↓
エトポシド(VP-16) 100mg/ m ²	mg	点滴	↓	↓	↓	↓	↓						↓

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	mg	点滴	↑	(↑)	(↑)	(↑)	(↑)		ここまで 入院にて 実施		3 週間を 1 コース	↑
デキサート 6.6mg/body	mg	点滴	↑	↑	↑	↑	↑					↑
ラシックス 20mg/body	mg	静注	↑	↑	↑	↑	↑					↑
プリンペラン 20mg/body	mg	点滴	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑		↑		↑↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ブレオ	5mg	生食 100mL	30 分/点滴
	15mg		
②プリンペラン	10mg	生食 100mL	15 分/点滴

(Day16)

投与間隔≫

(15 分)

(30 分)

投与順番≫

②

→

①

→

終了

【備考】

.....

.....

.....