

レジメン番号	0014	レジメン名	FEC
登録診療科	乳腺外科・内分泌外科	使用薬剤	フルオロウラシル、エピルビシン、 エンドキサン
がん腫	乳癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
フルオロウラシル 500mg/m ²	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
エピルビシン(EPI) 100mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
エンドキサン(CPA) 500mg/m ²	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

プロイメンド 150mg/body	点滴	mg	↑	3週間を1コース	↑
A)アロキシ (0.75) B)グラニセトロン (1)	点滴	mg	↑		↑
デキサート 9.9 mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①フルオロウラシル	250mg	生食 100mL	15分/点滴
	1000mg		
②エピルビシン	10mg	生食 100mL	10分/点滴
	50mg		
③エンドキサン	100mg	生食 100mL	30分/点滴
	500mg		
④	アロキシ	生食 100mL	15分/点滴
	グラニセトロン		
	デキサート		
⑤プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑥生食	50mL		5分/点滴

投与間隔>> (30分) (15分) (10分) (30分) (15分) (5分)

投与順番>> ⑤ → ④ → ② → ③ → ① → ⑥ → 終了

【備考】

⑤プロイメンド：内服アプレピタント（day1 125mg、day2以降 80mg）使用の場合は投与しない