

レジメン番号	0158	レジメン名	AVASTIN+RPMI
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	アバスタチン、レボホリナート、フルオロウラシル
がん腫	大腸癌	インターバル日数	56日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day8 ( / )	Day15 ( / )	Day22 ( / )	Day29 ( / )	Day36 ( / )	Day43 ( / )	…Day56	Day1 ( / )
アバスタチン(Bev) 5mg/kg/day	点滴	mg	↓		↓		↓		↓	8週間を 1コース	↓
レボホリナート(L-LV) 250mg/ m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓			↓
フルオロウラシル(5FU) 500mg/ m <sup>2</sup> /日	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓			↓

(支持療法)

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○を mg	↑	↑	↑	↑	↑	↑		8週間を 1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑	↑	↑	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アバスタチン	100mg	生食 100mL	下記参照/点滴
	400mg		
②レボホリナート	25mg	生食 250mL	120分/点滴
	100mg		
③フルオロウラシル	250mg	生食 50mL	全開/点滴
	1000mg		
④ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100mL	30分/点滴
	1mg		
	3.3mg		

投与間隔≫ (下記参照) (30分) (120分)  
 投与順番≫ ① → ④ → ② → ②開始60分後  
 ③を全開で投与 → 終了

【備考】

① アバスタチン投与時間 初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分