

レジメン番号	0221	レジメン名	エルロチニブ+GEM
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	タルセバ、ジェムザール
がん腫	切除不能膀胱癌	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	…Day28	Day1 (/)
ジェムザール(GEM) 1,000mg/m ² /日	点滴	mg	↓	↓	↓	4週間を1コース	↓
タルセバ ※下記参照	内服	mg	↓	↓(Day2-28)			↓

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	○を mg	↑	↑	↑	4週間を1コース	↑
デキサート 3.3mg/body	点滴	3.3mg	↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ジェムザール	200mg	生食 100mL	30分/点滴
	1,000mg		
②	アロキシ	生食 100mL	全開/点滴
	グラニセトロン		
	デキサート		

投与間隔≫ (全開) (30分)
 投与順番≫ ② → ① → 終了

【備考】

・タルセバ(100mg/日): 連日内服する