

レジメン番号	0435	レジメン名	VR-CAP(週 2 回)(皮下注)
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ベルケイド、リツキサン/リツキシマブ BS、 エンドキサン、ドキシソルビシン、プレドニゾロン
がん腫	悪性リンパ腫	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day4 (/)	Day8 (/)	Day11 (/)	…Day21	Day1 (/)
ベルケイド 1.3mg/m ²	皮下	mg	↓	↓	↓	↓	3 週間を 1 コース	↓
リツキサン/リツキシマブ BS 375 mg/m ²	点滴	mg	↓					↓
エンドキサン(CPA) 750mg/m ²	点滴	mg	↓					↓
ドキシソルビシン(DXR) 50mg/m ²	点滴	mg	↓					↓
プレドニゾロン(PSL) 100mg/m ² (減量可)	経口	mg	Day 1~5					Day 1~5

(支持療法)

※1 経口剤あり

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	静注	○ mg	↑				3 週間を 1 コース	↑
--------------------------------	----	------	---	--	--	--	----------------	---

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ベルケイド	3mg	生食 1.2mL	皮下注
②リツキサン/リツキシマブ BS	100mg 500mg	生食で 10 倍に希釈	※2 下記参照/輸注ポンプ
③エンドキサン	100mg 500mg	生食 250mL	60 分/点滴
④ドキシソルビシン	10mg 50mg	生食 100mL	15 分/点滴
⑤ アロキシ または グラニセトロン	0.75mg 1mg	生食 20mL	静注
⑥プレドニゾロン経口	5mg		経口

投与間隔≫ (メインルート/持続) ※3 (皮下注) (側管) (側管/静注) (側管/15分) (側管/60分)

投与順番≫ ⑦ → ① → ② → ⑤ → ④ → ③ → 終了

【備考】

※1 解熱鎮痛剤及び抗ヒスタミン剤の予防投与を行う

※2 初回投与時は、最初の 30 分は 50mg/時の速度で点滴静注を開始し、患者の状態を十分観察しながら、

その後注入速度を 30 分毎 に 50mg/時ずつ上げて、最大 400mg/時まで速度を上げることができる。

また、2 回目以降の注入開始速度は、初回投与時に発 現した副作用が軽微であった場合、100mg/時まで上げて

開始し、その後 30 分毎に 100mg/時ずつ上げて、最大 400mg/時まで上げることができる。

※3 ⑦メインルート：5%ブドウ糖 250mL (VR-CAP 投与終了後抜針)