

| | | | |
|--------|------|----------|------------------|
| レジメン番号 | 0438 | レジメン名 | アバスチン+PTX weekly |
| 登録診療科 | 産婦人科 | 使用薬剤 | アバスチン、パクリタキセル |
| がん腫 | 子宮頸癌 | インターバル日数 | 21 日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | Day 8 (/) | Day 15 (/) | …Day21 | Day1 (/) |
|-------------------------------------|------|-------|---------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| パクリタキセル(PTX) 80mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | ↓ | ↓ | 3 週間を 1 コース | ↓ |
| アバスチン(Bev) 15mg/kg | 点滴 | mg | ↓ | | | | ↓ |

(支持療法)

| | | | | | | | |
|---|----|----|---|---|---|-------------|---|
| デキサート 初回 9.9mg/body 2 回目以降 6.6mg/body | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | ↑ | 3 週間を 1 コース | ↑ |
| ファモチジン 20mg/body | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | ↑ | | ↑ |
| ネオレスタール 10mg/body | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | ↑ | | ↑ |
| グラニセトロン 1mg/body | 点滴 | mg | ↑ | ↑ | ↑ | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|-----|---------|-----------------|----------|----------|
| ① | パクリタキセル | 30mg | 生食 250mL | 60 分/点滴 |
| | | 100mg | | |
| ② | アバスチン | 100mg | 生食 100mL | ※下記参照/点滴 |
| | | 400mg | | |
| ③ | デキサート | 初回 9.9mg | 3.3mg | 生食 100mL |
| | | 2 回目以降 6.6mg | | |
| | ファモチジン | 20mg | | |
| | ネオレスタール | 10mg | | |
| ④ | グラニセトロン | 1mg | 生食 100mL | 30 分/点滴 |
| ⑤ | 生食 | 50mL | | 5 分/点滴 |

投与間隔≫ (※下記参照) (15 分) (30 分) (60 分) (5 分)
 投与順番≫ ② → ③ → ④ → ① → ⑤ → 終了

【備考】

※アバスチン投与時間 初回 90 分/2 回目 60 分/3 回目以降 30 分