

レジメン番号	0461	レジメン名	低用量 CF
登録診療科	皮膚科	使用薬剤	シスプラチン、フルオロウラシル
がん腫	有棘細胞癌	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	Day4 (/)	Day5 (/)	・ ・ Day28	Day1 (/)
シスプラチン(CDDP) 5~10mg/body	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	4週間を 1コース	↓
フルオロウラシル(5-FU) 800~1000mg/body	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ mg	↑	(↑)	(↑)	(↑)	(↑)	4週間を 1コース	↑
--------------------------------	----	---------	---	-----	-----	-----	-----	--------------	---

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① シスプラチン	10mg	生食 250mL	②と同時に 5時間/点滴
	25mg		
	50mg		
② フルオロウラシル	250mg	生食 250mL	①と同時に 5時間/点滴
	1000mg		
③ アロキシ または グラニセトロン	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	1mg		
④ 生食	50mL	生食 50mL	5分/点滴

投与間隔≫ (15分/点滴) ① (5時間/点滴) (5分/点滴)

投与順番≫ ③ → ② → ④ → 終了

【備考】

.....

.....

.....

.....

.....