

レジメン番号	0323	レジメン名	S-1+PTXdiv+PTXip
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	パクリタキセル、エスワンタイホウ
がん腫	胃癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2~7	Day 8 (/)	Day9~14	…Day21	Day1 (/)
パクリタキセル(PTX) 50mg/m ²	点滴	mg	↓		↓		3週間を 1コース	↓
パクリタキセル(PTX) 20mg/m ²	腹腔内	mg	↓		↓			↓
エスワンタイホウ (S-1) ※1 下記参照	内服	mg	↓	↓	↓	↓		

(支持療法)

薬品名 投与量	投与方法	初回 9.9mg	2回目以降 6.6mg	Day1 (/)	Day2~7	Day 8 (/)	Day9~14	…Day21	Day1 (/)
デキサート 初回 9.9mg/body 2回目以降 6.6mg/body	点滴			↑		↑		3週間を 1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg		↑		↑			↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg		↑		↑			↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg		↑		↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①パクリタキセル (点滴)	30mg	生食 250mL	60分/点滴
	100mg		
②パクリタキセル (腹腔内)	30mg	生食 1000mL (生食 500mL)	※2 下記参照/腹腔内
	100mg		
③	デキサート 初回 9.9mg 2回目以降 6.6mg	3.3mg 生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン		
	ネオレスタール		
④	グラニセトロン	3mg 生食 100mL	30分/点滴
⑤	生食	50mL	5分/点滴



【備考】

※1 S-1 投与量 BSA < 1.25 m² : 80mg/day

1.25 m² ≤ BSA < 1.5 m² : 100mg/day

BSA ≥ 1.5 m² : 120mg/day

※2 生食 1000mL は 120分 で投与、生食 500mL であれば 60分 で投与可能