

レジメン番号	0660	レジメン名	Cetuximab(併用療法 BRAF)
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	アービタックス、ビラフトビ、メクトビ
がん腫	BRAF 変異陽性大腸癌	インターバル日数	7日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・day 7	Day1 (/)
アービタックス (Cetuximab) 初回 400mg/ m ² /日 以後 250mg/ m ² /日	点滴	mg	↓	1週間を1コース	↓
ビラフトビ 300mg/日	経口	mg	↓	↓	↓
メクトビ 90mg/日	経口	mg	↓	↓	↓

(支持療法)

デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	1週間を1コース	↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アービタックス	100mg	生食 250mL	下記参照/点滴
②	デキサート	生食 100ml	15分/点滴
	ネオレスタール		
③	生食	生食 100ml	30分/点滴
④	生食	生食 100ml	60分/点滴

投与間隔≫ (15分) (30分) (下記参照) (60分)
 投与順番≫ ② → ③ → ① → ④ → 終了

【備考】

①アービタックス投与速度：初回 120分/2回目以降 60分

・ビラフトビ：1日1回 300mg 服用（休薬なし）

・メクトビ：1日2回 45mg/回服用（休薬なし） ※メクトビはなしでも可