

| | | | |
|--------|----------------|----------|---------------------------|
| レジメン番号 | 0669 | レジメン名 | GEM+nabPTX+PTXip |
| 登録診療科 | 消化器内科Ⅱ・総合消化器外科 | 使用薬剤 | ジェムザール、アブラキサン、 パクリタキセル |
| がん腫 | 膵癌 | インターバル日数 | 28日 |

【投与量・投与スケジュール】


| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | Day8 (/) | Day15 (/) | …Day28 | Day1 (/) |
|---|------|-------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| アブラキサン (nab-PTX) 75mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | ↓ | ↓ | 4週間を1コース | ↓ |
| ジェムザール(GEM) 800mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | ↓ | ↓ | | ↓ |
| パクリタキセル(PTX) 20mg/m ² | 腹腔内 | mg | ↓ | ↓ | ↓ | | ↓ |

(支持療法)

| | | | | | | | |
|------------------------------|----|-----------|---|---|---|----------|---|
| A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1) | 点滴 | ○ を mg | ↑ | ↑ | ↑ | 4週間を1コース | ↑ |
| デキサート 6.6mg/body | 点滴 | 6.6mg | ↑ | ↑ | ↑ | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|---|--------|-----------|----------|
| ①アブラキサン | 100mg | 生食 100mL | 30分/点滴 |
| ②ジェムザール | 200mg | 生食 100mL | 30分/点滴 |
| | 1000mg | | |
| ③パクリタキセル | 30mg | 生食 1000mL | 120分/腹腔内 |
| | 100mg | | |
| ④ アロキシ または グラニセトロン または デキサート | 0.75mg | 生食 100mL | 15分/点滴 |
| | 1mg | | |
| | 3.3mg | | |
| ⑤生食 | 50ml | | 5分/点滴 |



【備考】
