レジメン番号	0037	レジメン名	5FU/l-LV+CPT11(3&2)
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	フルオロウラシル、レボホリナート、トポテシン
がん腫	大腸癌	インターバル日数	35 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	･･･Day35	Day1 (/)
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ (l-LV) 250mg/ m²/日	点滴	mg	↓	↓	↓	5 週間を 1 コース	↓
フルオロウラシル（5FU） 500mg/ m²/日	点滴	mg	↓	↓	↓		↓
トポテシン(CPT-11) 100mg/body/日	点滴	mg	↓	↓	↓		↓

（支持療法）

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	◯ を mg	↑	↑	↑	5 週間を 1 コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①レボホリナート		25mg 100mg	5%ブドウ糖液 250mL	120 分/点滴
② フルオロウラシル		250mg	生食 50mL	全開/点滴
③トポテシン		40mg 100mg	5%ブドウ糖液 250mL	90 分/点滴
④	アロキシ または	0.75mg	生食 100mL	30 分/点滴
	グラニセトロン	1mg		
	デキサート	3.3mg		

投与間隔≫ (30 分) (90 分) (120 分) ①開始 60 分後②を

投与順番≫ ④ → ③ → ① → 全開で投与する → 終了

【備考】