レジメン番号	0044	**レジメン名**	5FU/l-LV+CPT11bw
登録診療科	総合消化器外科	**使用薬剤**	フルオロウラシル、レボホリナート、トポテシン
がん腫	大腸癌	**インターバル日数**	14 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	**患者投与量**	Day1 (/)	･･･Day14	Day1 (/)
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ (LV) 250mg/ m²/日	点滴	**mg**	↓	2 週間を 1 コース	↓
フルオロウラシル（5FU) 500mg/ m²/日	点滴	**mg**	↓		↓
トポテシン(CPT-11) 150mg/㎡/日	点滴	**mg**	↓		↓

（支持療法）

A) アロキシ(0.75) **B) グラニセトロン(1)**	点滴	○ **を** **mg**	↑	2 週間を 1 コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	**mg**	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①レボホリナート		25mg 100mg	5%ブドウ糖液 250mL	120 分/点滴
②フルオロウラシル		250mg	生食 50mL	全開/点滴
③トポテシン		40mg 100mg	5%ブドウ糖液 250mL	90 分/点滴
④	**アロキシ** または **グラニセトロン**	0.75mg 1mg	生食 100mL	30 分/点滴
	デキサート	3.3mg		

投与間隔≫　　(30 分)　　(90 分)　　(120 分)　　①開始 60 分後②を

投与順番≫　④ → ③ → ① → 全開で投与する → 終了

【備考】