レジメン番号	0047	レジメン名	5FU/l-LV(6&2)
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	フルオロウラシル、レボホリナート
がん腫	大腸癌	インターバル日数	56 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	Day22 (/)	Day29 (/)	Day36 (/)	…Day56	Day1 (/)
レボホリナート（l-LV） 250mg/ m²/日	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	8 週間を 1 コース	↓
フルオロウラシル（5FU） 500mg/ m²/日	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓		↓

（支持療法）

A）アロキシ(0.75) B）グラニセトロン(1)	点滴	◯を mg	↑	↑	↑	↑	↑	↑	8 週間を 1 コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑	↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①レボホリナート		25mg 100mg	5%ブドウ糖液 250mL	120 分/点滴
②フルオロウラシル		250mg	生食 50mL	全開/点滴
③	アロキシ または	0.75mg	生食 100mL	30 分/点滴
	グラニセトロン	1mg		
	デキサート	3.3mg		

投与間隔≫　　(30 分)　　(120 分)

投与順番≫　③ ⟶ ① ⟶ ①開始 60 分後②を全開で投与する ⟶ 終了

【備考】